

ADMINISTRATION INTRAVEINEUSE DE FER ORDONNANCE INDIVIDUELLE STANDARDISÉE

Direction clinique _____ Programme _____ Site _____

Administration intraveineuse (IV) de fer saccharose, de complexe de fer gluconate de sodium ou de fer isomaltoside

- Pour les installations externes, l'usager doit être capable de se déplacer à l'installation prévue (ex. : CLSC) pour recevoir son traitement. Il doit aussi être ambulant et autonome (ex. : être capable de se transférer sur la chaise de perfusion et de décrire ses symptômes) ou être accompagné d'un proche aidant.
- Envisager l'administration en centre hospitalier si état instable, allergie antérieure à un fer injectable ou allergies multiples.

Poids _____ kg Taille _____ cm

Allergie(s) _____

Intolérance(s) _____

À l'intention de la pharmacie _____ Téléphone _____ Télécopieur _____

À l'intention du professionnel _____ Téléphone _____ Télécopieur _____

INDICATION DE TRAITEMENT

Cocher le fer injectable et la dose

- Fer **saccharose** 20 mg/ml, fiole 5 ml
 100 mg 200 mg 300 mg
- Fer **gluconate** 12,5 mg/ml, fiole 5 ml
 62,5 mg F125 mg
- Fer **isomaltoside** 100 mg/ml, fiole 5 ml ou 10 ml
 500 mg 1 000 mg

La dose de 1 500 mg sera administrée uniquement dans un centre avec une présence médicale dans l'installation.

Redilution et vitesse d'administration selon le « CIUSSSCN-PRO-2022-02 Protocole d'administration intraveineuse (IV) de fer saccharose, de complexe de fer gluconate, de sodium ou de fer isomaltoside ».

Répondre aux questions suivantes

Nombre de doses à donner _____

Intervalle entre les doses 1 semaine 1 mois Autre _____ Non applicable

Délai accepté pour l'administration de la première dose en externe _____ Moins de 7 jours

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D'EFFETS INDÉSIRABLES OU DE CONDITION LIMITANT L'APPLICATION DU PROTOCOLE

Nom _____ Téléphone _____ Télécopieur _____

En cas d'hypotension persistante malgré les mesures de base, administrer un bolus NaCl 0,9% Aucun 500 ml 1 000 ml

Se référer à l'ordonnance collective CIUSSSCN-OC2022-03 et au protocole médicale CIUSSSCN-PRO-2022-03 Initier le traitement d'une réaction indésirables légère à sévère secondaire à l'administration intraveineuse de fer.

Note : Si l'ordonnance est acheminée par télécopieur, l'original doit être déposé au dossier médical.

Nom du prescripteur _____

Date _____ Signature _____ Profession _____ Numéro permis _____
 aaaa/mm/jj

Adopté par le comité de pharmacologie du 2023-11-01

Légende cm : centimètre kg : kilogramme mg : milligramme ml : millilitre NaCl : chlorure de sodium

Section réservée pour la signature électronique