

Ciprofloxacine Levofloxacine Moxifloxacine

POSOLOGIE : _____

1 ACTION DU MÉDICAMENT

- Ce médicament est un antibiotique qui traite différentes infections causées par des bactéries.

2 CONSERVATION ET ADMINISTRATION

- **Les sacs se conservent à la température ambiante (15–30°C) et à l’abri de la lumière.**
 - Sortez le sac de l’emballage en aluminium juste avant l’utilisation.
- NN’utilisez pas si la date d’expiration est dépassée, si la solution est brouillée, colorée ou si elle contient des particules en suspension.

3 PRÉCAUTIONS PARTICULIÈRES

- Même si vous vous sentez mieux, il est important de compléter la durée de traitement prescrite par votre médecin. Si le médicament est cessé trop rapidement, l’infection peut réapparaître.
- Mentionnez à votre pharmacien toutes les allergies dont vous souffrez avant de débuter votre traitement.
- Avisez le médecin ou le pharmacien avant de débuter un médicament que vous ne consommez pas durant votre séjour à l’hôpital.
- Avisez votre pharmacien et votre médecin si vous êtes enceinte ou si vous allaitez.

4 EFFETS INDÉSIRABLES QUE VOUS POURRIEZ NOTER (généralement légers à modérés)

- Nausées et/ou vomissements
- Selles molles, diarrhées ou constipation
- Maux de tête
- Troubles du sommeil ou sensation de fatigue
- **Peau sensible au soleil.** Appliquez un écran solaire si exposition au soleil.

5 CONSULTEZ VOTRE MÉDECIN SI VOUS NOTEZ

- Une persistance ou une augmentation des symptômes de votre infection après quelques jours de traitement, notamment la fièvre.

OU UN DE CES EFFETS PLUS RARES

- Une éruption cutanée (rougeur, démangeaison) ou une difficulté subite à respirer. Dans ce cas, cessez de prendre ce médicament et rendez-vous immédiatement à l’urgence la plus près de chez vous.
- L’apparition des symptômes suivants : douleur, sensation de brûlure, fourmillements, engourdissements, faiblesse et changement de la sensation au toucher au niveau des bras et des jambes.
- De la diarrhée grave et persistante. Évitez d’utiliser un médicament contre la diarrhée (ex : Imodium^{md}) sans en parler d’abord à votre pharmacien ou à votre médecin.
- Des nausées ou vomissements qui persistent.

- Ciprofloxacin Levofloxacin Moxifloxacin

POSODOLOGY : _____

1 ACTION OF THE DRUG

- This medicine is an antibiotic that treats different infections caused by bacteria.

2 STORAGE AND ADMINISTRATION

- **Infusion bags are stored at room temperature (15–30°C) and protected from light.**
 - Take the bag out from the foil packaging just before use.
- Do not use if expiry date has passed, if the solution is cloudy, colored or if it contains suspended particles.

3 SPECIAL PRECAUTIONS

- It is important to complete the duration of treatment prescribed by your physician even if you feel better. Infection may reappear if the medicine is stopped too soon.
- Tell your pharmacist about the allergies you have before starting your treatment.
- Notify the physician or the pharmacist before starting a medicine you were not taking during your hospital stay.
- Notify your pharmacist and your physician if you are pregnant or breastfeeding.

4 ADVERSE EFFECTS THAT YOU MIGHT NOTICE (generally mild to moderate)

- Nausea and/or vomiting
- Loose stools, diarrhea or constipation
- Headache
- Sleep disturbance or feeling of fatigue
- **Sun-sensitive skin.** Apply sunscreen if sun exposure.

5 CONSULT YOUR PHYSICIAN IF YOU NOTICE

- Persistence or increase in symptoms of your infection after a few days of treatment, such as fever.

OR ONE OF THESE UNCOMMON EFFECTS

- Skin rash (redness, itching) or sudden difficulty in breathing. In this case, stop taking this medicine, and go immediately to the nearest emergency department to you.
- Onset of following symptoms: pain, burning sensation, tingling, numbness, weakness and change in touch sensation of the arms and legs.
- Severe and persistent diarrhea. Avoid using antidiarrheals (e.g., Imodium®) without first talking to your pharmacist or your physician.
- Nausea or vomiting that persists.