



INFO-MEDICAMENTO

ANTIFÚNGICOS INTRAVENOSOS EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

- Anfotericina B Anidulafungina Caspofungina Fluconazol

DOSIS: _____

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento se utiliza para tratar diversas infecciones causadas por un hongo.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Guardar en el centro del refrigerador (sobre una repisa; evitar en la puerta del refrigerador).
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.
- Si la anfotericina B es el tratamiento que usted recibe, es normal que la solución sea opaca y de color amarillo brillante.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Si es necesario, es importante hacerse los análisis de sangre que se le hayan prescrito para que el equipo médico pueda asegurarse de que el tratamiento es eficaz y seguro.
- **Informe a su médico o farmacéutico antes de empezar a tomar cualquier medicamento que no estuviera tomando durante su estancia en el hospital.**
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Diarrea, dolor abdominal (malestar estomacal)
- Náuseas y/o vómitos
- Dolores de cabeza
- Fiebre y escalofríos (anfotericina y caspofungina)
- Pueden aparecer reacciones relacionadas con la perfusión (fiebre, escalofríos, náuseas, vómitos, dolor de cabeza) de 1 a 2 horas después del inicio de la perfusión, pero disminuyen con el uso continuo.

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Náuseas o vómitos persistentes.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.
- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.
- La aparición de dolores musculares inexplicables y/o palpitaciones cardíacas.
- Si sus heces se vuelven blanquecinas, si su orina o su piel se oscurecen o si el blanco de sus ojos se vuelve más amarillo.