



INFO-MEDICAMENTO

CLINDAMICINA INTRAVENOSA EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

DOSIS: _____

1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Guardar en el centro del refrigerador (sobre una repisa; evitar en la puerta del refrigerador).
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia, coloreada o si contiene partículas en suspensión.

3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Aunque se sienta mejor, tiene que completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Dolor abdominal
- Heces blandas o diarrea
- Náuseas y/o vómitos
- Gusto metálico

5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- La aparición de calambres abdominales severos y diarrea, náuseas, vómitos, pérdida de peso y fatiga durante o después de dejar el antibiótico requiere la consulta inmediata con un médico. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin el acuerdo de un farmacéutico o un médico.
- Náuseas o vómitos persistentes.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.