

## INFO-MEDICAMENTO

### LINEZOLID INTRAVENOSO EN RÉGIMEN AMBULATORIO O A DOMICILIO

DOSIS: \_\_\_\_\_

#### 1. ACCIÓN DEL MEDICAMENTO:

- Este medicamento es un antibiótico que trata diversas infecciones causadas por bacterias.

#### 2. CONSERVACIÓN Y ADMINISTRACIÓN:

- Las bolsas deben conservarse a temperatura ambiente (15-30 °C) y protegidas de la luz.
  - Retire la bolsa del envase de aluminio justo antes de usarla.
- No utilizar si ha pasado la fecha de caducidad, si la solución está turbia o si contiene partículas en suspensión.
- Puede ser que el color del antibiótico adquiera una tonalidad amarillenta, oscureciéndose durante el tratamiento.

#### 3. PRECAUCIONES ESPECIALES:

- Informe a su farmacéutico y a su médico de cualquier alergia que padezca antes de iniciar el tratamiento.
- Aunque se sienta mejor, es importante completar el tratamiento prescrito por su médico. Si se interrumpe la medicación demasiado rápido, la infección puede reaparecer.
- El antibiótico puede reaccionar con una sustancia presente de forma natural en ciertos alimentos, la tiramina. Se debe **evitar consumir grandes cantidades** de estos alimentos. Los alimentos ricos en tiramina son: quesos curados, carnes fermentadas, chucrut, salsa de soya, cerveza de barril y vino tinto.
- Informe a su médico o farmacéutico si está tomando un antidepresivo cuando empiece a tomar este antibiótico O antes de empezar a tomar cualquier medicamento que no estuviera tomando durante su estancia en el hospital.
- Si es necesario, es importante hacerse los análisis de sangre que se le hayan prescrito para que el equipo médico pueda asegurarse de que el tratamiento es eficaz y seguro.
- Informe a su farmacéutico y a su médico si está embarazada o en periodo de lactancia.

#### 4. EFECTOS SECUNDARIOS QUE PUEDE OBSERVAR (generalmente de ligeros a moderados):

- Náuseas y/o vómitos
- Diarrea o estreñimiento
- Dolores de cabeza
- Hipertensión (poco frecuente)
- Cambios en el gusto y decoloración de la lengua

#### 5. CONSULTE A SU MÉDICO SI OBSERVA:

- Una persistencia o un aumento de los síntomas de su infección después de unos días de tratamiento, en particular fiebre.

##### O UNO DE ESTOS EFECTOS MÁS RAROS:

- Náuseas o vómitos severos o persistentes.
- Entumecimiento, hormigueo o sensación de ardor en brazos o piernas
- La aparición de fiebre, sudoración intensa, temblores, confusión o agitación.
- Disminución o cambio de la visión o sensación de visión borrosa.
- Una erupción cutánea (enrojecimiento, comezón) o una dificultad respiratoria repentina. En ese caso, deje de tomar el medicamento y acuda inmediatamente al servicio de urgencias más cercano.
- Diarrea grave y persistente. Evite el uso de cualquier medicamento contra la diarrea (por ejemplo: Imodium®) sin consultar antes con su farmacéutico o médico.