

PROTOCOLE DE PRÉPARATION CIPROFLOXACINE - PÉDIATRIE

IV Intermate^{MD} (Baxter)

MÉDICAMENT :
CIPROFLOXACINE (Cipro^{MD})


POSOLOGIE :
IV aux 8, 12 ou 24 heures

DILUANT :
Dextrose 5%

TEMPS D'ADMINISTRATION :
60 minutes

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :
Utiliser solution de ciprofloxacin à **2 mg/ml** (déjà reconstituée)

Prélever le volume de médicament requis
Injecter dans le modèle d'Intermate^{MD} correspondant
Ajouter le volume de diluant requis pour l'obtention d'un volume final préétabli



Ordonnance	Fabrication		
Dose (mg)	Volume de médicament (ml)	Modèle d'Intermate ^{MD}	Volume de diluant (ml)
50 à 200	25 à 100, selon dose	SV100	Compléter pour volume final de 100 ml
201 à 400	100 à 200, selon dose	LV250	Compléter pour volume final de 250 ml

Purger la tubulure

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :
Pour concentration de 0,5 - 2 mg/ml : 9 jours au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 17/01/2018.