

PROTOCOLE DE PRÉPARATION ERTAPÉNEM – ADULTE

IV Intermate^{MD} (Baxter)

MÉDICAMENT :
ERTAPÉNEM (INVanz^{MD})

POSOLOGIE :
IV aux 24 heures

DILUANT :
NaCl 0,9%

TEMPS D'ADMINISTRATION :
Voir tableau

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :
Utiliser solution d'ertapénem à **100 mg/ml** (reconstituée avec eau stérile)

Prélever le volume de médicament requis
Injecter dans le modèle d'Intermate^{MD} correspondant
Ajouter le volume de diluant requis pour l'obtention d'un volume final préétabli



Ordonnance	Fabrication			
	Dose (mg)	Volume de médicament (ml)	Modèle d'Intermate ^{MD}	Temps d'administration (min)
500	5	SV100	30 [^]	45
1000	10	SV200	30	90
1500	15	SV200	30	85

[^] Le temps d'administration pourrait être inférieur à celui indiqué en raison du sous-remplissage de l'Intermate^{MD}

Purger la tubulure

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 10-20 mg/ml : 8 jours au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 22 mars 2018.
2. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 17/01/2018.