

PROTOCOLE DE PRÉPARATION FLUCONAZOLE – 200, 600 ET 800 MG

IV gravité

MÉDICAMENT :

FLUCONAZOLE (Diflucan^{MD})

POSOLOGIE :

IV aux 24 heures

TEMPS D'ADMINISTRATION :

200 mg : 1 heure

600 mg : 3 heures

800 mg : 4 heures

PRÉPARATION DANS L'ENCEINTE DE PRÉPARATION STÉRILE :

Utiliser solution de fluconazole à **2 mg/ml** (déjà reconstituée)

Prélever la quantité requise de médicament

Injecter dans un sac vide

DURÉE LIMITE D'UTILISATION :

Pour concentration de 2 mg/ml : 9 jours au réfrigérateur ou 30 heures à température pièce.

RÉFÉRENCES :

1. Bing CD, Nowobilski-Vasilios A et al. Extended Stability for parenteral drugs. 6e édition. American Society of Health-System Pharmacists. 2017
2. Trissel LA. Handbook on Injectable Drugs. American Society of Health-System Pharmacists; Consulté en ligne via Lexicomp le 22 mars 2018.
3. Ordre des pharmaciens du Québec. Préparation de produits stériles non dangereux en pharmacie – Norme 2014.01; Consultée en ligne le 17/01/2018.