

- Si un TLIG (QuantiFERON) a été fait, joindre le rapport.
- Pour les infirmières de la santé publique : s'il s'agit d'un contact d'un cas de tuberculose contagieuse, acheminer le questionnaire du contact.
- Pour les infirmières des autres secteurs : s'il s'agit d'un TCT positif sans contact avec un cas de tuberculose, acheminer le questionnaire TCT positif sans contact avec un cas de tuberculose.
 - **Important** Pour toute suspicion de tuberculose contagieuse chez l'adulte, faire signaler le pneumologue de garde de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ) en appelant au 418 656-8711.
- Clinique de traitement de l'infection tuberculeuse latente (ITL) du CIUSSS de la Capitale-Nationale est dédiée à une clientèle adulte. Toute demande concernant la tuberculose pour un usager de moins de 18 ans doit être acheminée par télécopieur au département d'infectiologie pédiatrique du Centre hospitalier de l'Universitaire Laval (CHUL), au numéro 418 577-2032 ou au numéro 418 577-2031.

Acheminer la demande de référence

Par télécopieur au 418 656-4832

Par courriel au : clinique.itl.dsm.ciusscscn@ssss.gouv.qc.ca

Clinique de traitement de l'infection tuberculeuse latente (ITL)

CIUSSS de la Capitale-Nationale

Hôpital Jeffery Hale

1250, chemin Sainte-Foy, local 223-D (1^{re} étage)

Québec (Québec) G1S 2M6

Téléphone 418 666-1626